

La mésotrione

Commercialisée sous le nom de Callisto.

- En traitement de post-levée précoce.
- Remplacerait l'Amétryne (ex Gésapax).

mode d'action

Herbicide sélectif, à pénétration foliaire et racinaire (absorbé par les feuilles et les racines).

doses d'emploi

150 g de matière active /ha, (soit 1,5 l/ha de Callisto à 100g de mésotrione/l en suspension concentrée).

précautions d'emploi

R36 - irritant pour les yeux.

R43 - peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

D'après les résultats des essais conduits à La Réunion, la mésotrione est efficace principalement sur les dicotylédones, mais également sur certaines graminées.

Pour les graminées :

- Herbe de l'eau, herbe cochon (*commelina benghalensis*)
- Chiendent-caille, herbe-caille (*digitaria*)

Pour les dicotylédones :

- Pariétaire, brède pariétaire, paillatère (*amaranthus*)
- Liseron (*Ipomoea*)

- Herbe à bouc (*ageratum conyzoides*)
- Colle-colle guérit vite (*segesbeckia orientalis*)
- Sensitive, trompe la mort (*mimosa pudica*)
- Petit trèfle, ti trèfle (*oxalis corniculata*)
- Morelle, brède morelle, brède martin (*solanum nigrum*)

